


Polyartikuläre juvenile idiopathische Arthritis (JI)

Was ist polyartikuläre juvenile idiopathische Arthritis? ¹

- Die polyartikuläre juvenile idiopathische Arthritis, früher als juvenile rheumatoide Arthritis bezeichnet, ist die häufigste Art von Arthritis bei Kindern unter 16 Jahren.
- JI kann zu anhaltenden Gelenkschmerzen, Schwellungen und Steifheit führen. Bei manchen Kindern können die Symptome nur einige Monate lang auftreten, während andere mehrere Jahre lang darunter leiden.
- Einige Arten von JI können zu schwerwiegenden Komplikationen führen, wie Wachstumsstörungen, Gelenkschäden und entzündeten Augen.



Referenz :

1. Mayo Clinic. Juvenile idiopathic arthritis
<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/juvenile-idiopathic-arthritis/symptoms-causes/syc-20374082> Accessed October 2024.

Was sind die Symptome von JI? ¹

- Es gibt mehrere verschiedene Untertypen der juvenilen idiopathischen Arthritis, und die Art der JI hängt von den Symptomen, der Anzahl der betroffenen Gelenke und dem möglichen Auftreten von Fieber und Hautausschlägen ab.
- Im Laufe der Zeit können sich die Symptome in unregelmäßigen Abständen verschlechtern, bessern oder ausbleiben.
- Es gibt extra-skelettale Manifestationen, die die Symptomatik vervollständigen (besonders an den Augen).

Symptome der polyartikulären juvenilen idiopathischen Arthritis

Schmerzen. Auch wenn Ihr Kind nicht über Gelenkschmerzen klagt, bemerken Sie vielleicht, dass es humpelt, vor allem morgens oder nach einem Mittagsschlaf.

Schwellung. Gelenkschwellungen sind häufig, werden aber oft zuerst an den grossen Gelenken wie dem Knie bemerkt.

Steifheit. Sie bemerken vielleicht, dass Ihr Kind ungeschickter als sonst wirkt, vor allem morgens oder nach dem Mittagsschlaf.

Fieber, Schwellung der Lymphknoten und Hautausschlag. In einigen Fällen kann es zu hohem Fieber, Lymphknotenschwellungen oder einem Hautausschlag am Rumpf kommen - was Abends meist schlimmer ist.

