


Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire (AJI)

Qu'est-ce que l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire ?¹

- L'arthrite idiopathique juvénile polyarticulaire, anciennement appelée arthrite rhumatoïde juvénile, est le type d'arthrite le plus courant chez les enfants de moins de 16 ans.
- La AJI peut provoquer des douleurs articulaires persistantes, un gonflement et une raideur. Certains enfants peuvent présenter des symptômes pendant quelques mois seulement, tandis que d'autres en souffrent pendant plusieurs années.
- Certains types de AJI peuvent entraîner de graves complications, telles que des problèmes de croissance, des lésions articulaires et une inflammation oculaire.

Articulations normales



Articulations avec AP



Référence :

1. Mayo Clinic. Juvenile idiopathic arthritis
<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/juvenile-idiopathic-arthritis/symptoms-causes/syc-20374082> Accessed October 2024.

Quels sont les symptômes de la AJI ?¹

- Il existe plusieurs sous-types différents d'arthrite juvénile idiopathique. Le type de AJI dépend des symptômes, du nombre d'articulations touchées et de la présence éventuelle de fièvre et d'éruptions cutanées.
- Au fil du temps, les symptômes peuvent s'aggraver, s'améliorer ou cesser à intervalles irréguliers.
- Des manifestations extra-squelettiques existent et complètent la symptomatologie (particulièrement les yeux).

Symptômes de l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire

La douleur. Même si votre enfant ne se plaint pas de douleurs articulaires, vous pouvez remarquer qu'il boite, surtout le matin ou après une sieste.

Gonflement. Le gonflement des articulations est courant, mais il est souvent remarqué en premier lieu dans les grosses articulations, comme le genou.

Raideur. Vous pouvez remarquer que votre enfant semble plus maladroit que d'habitude, en particulier le matin ou après la sieste.

Fièvre, gonflement des ganglions lymphatiques et éruption cutanée. Dans certains cas, une forte fièvre, un gonflement des ganglions lymphatiques ou une éruption cutanée sur le tronc peuvent apparaître - ce qui est généralement pire le soir.



Boitement



Gonflement



Raideur



Fièvre