


Artrite idiopatica giovanile poliarticolare (AIG)

Che cos'è l'artrite idiopatica giovanile poliarticolare? ¹

- L'artrite idiopatica giovanile poliarticolare, precedentemente nota come artrite reumatoide giovanile, è il tipo di artrite più comune nei bambini di età inferiore ai 16 anni.
- La AIG può causare dolori articolari persistenti, gonfiore e rigidità. Alcuni bambini possono avere sintomi solo per pochi mesi, mentre altri ne soffrono per diversi anni.
- Alcuni tipi di AIG possono portare a gravi complicazioni, come problemi di crescita, danni alle articolazioni e infiammazione degli occhi.



Referenza:

1. Mayo Clinic. Juvenile idiopathic arthritis
<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/juvenile-idiopathic-arthritis/symptoms-causes/syc-20374082> Accessed October 2024.

INFL-EM-JJA-It-V1.0-01/10/2024

Quali sono i sintomi della AIG? ¹

- Esistono diversi sottotipi di artrite idiopatica giovanile e il tipo di AIG dipende dai sintomi, dal numero di articolazioni colpite e dalla presenza di febbre ed esantema.
- Nel corso del tempo, i sintomi possono peggiorare, migliorare o cessare ad intervalli irregolari.
- Esistono manifestazioni extrascheletriche che completano la sintomatologia (soprattutto gli occhi).


Sintomi dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare

Dolore. Anche se il bambino non si lamenta di dolori articolari, potreste notare che zoppica, soprattutto al mattino o dopo un pisolino.

Gonfiore. Il gonfiore delle articolazioni è comune, ma spesso si nota prima nelle articolazioni grandi, come il ginocchio.

Rigidità. Potreste notare che il vostro bambino sembra più goffo del solito, soprattutto al mattino o dopo un pisolino.

Febbre, ingrossamento dei linfonodi ed eruzione cutanea. In alcuni casi possono comparire febbre alta, linfonodi ingrossati o un'eruzione cutanea sul tronco, che di solito peggiora la sera.



INFL-EM-JJA-It-V1.0-01/10/2024